

**Ett års incidens av vaginal blödning, dess genes,
val av behandlingsregim och effektivitet
hos tidigt gravida kvinnor som söker sjukvård i Skaraborg**

Pasi Bauer

Handledare Prof P-G Larsson
Kvinnokliniken Skaraborg

Blödning i tidig graviditet

- En vanlig patient på kliniken
- Orsak?
- Antalet besök?
- 1) Aborter missfall
- 2) Utelivet? missfall
- 3) Ektopisk graviditet
- Effektivitet?
 - 4) "Normal" graviditet

Metod & urval

- Relevanta diagnoser
- Graviditetslängd $\leq 23+0$ *020.9*
- Ett års incidens from 12-06-01 *003.4*
- Journalgenomgång,
diagnosjustering *002.0*
000.9
003.9
002.1 *Z34.9*

Material


- 668 Kvinnor
- 702 Graviditeter
- 1425 Besök
- Förlösta 2013: 2548 st

Resultat

➤ Blödningsorsak

Grupp ➤	Prognos	Ålder	Paritet	Grav.längd	Antal besök	Patienter
Ektopisk graviditet		29.6	0.8	6+3	1,2	5%
	• Om viabel ➔ 12% missfall					
Uteblivet missfall		31.6	1.2	10+0	3,0	25%
	• Om oklart ➔ 34% missfall					
Spontant missfall		30.0	1.1	9+1	2,0	38%
Normal graviditet		28.6	1.0		1,5	32%
					1425st	702st

Behandling



Slutsatser

- 1,3 besök istället för kirurgi.
- Blödning med viabelt foster är förenligt med 88% överlevnad.
- 24% av graviditeterna blöder.
15% går till missfall.
10% förlösta kvinnor har blött.

Diskussion

- Förbättringspotential?
- Icd-kodens roll

6.020
020
000.9
002.1
003.9

Z34.9
002.0
003.4